

پیشگیری از ابتلا به پوکی استخوان و شکستگی‌های ناشی از آن

عوامل خطر قابل تغییر

میزان کلسیم مواد غذایی

دریافت روزانه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی‌گرم کلسیم در رژیم غذایی برای سلامت استخوان ضروری است. کلسیم مورد نیاز روزانه از طریق مواد غذایی زیر قابل دریافت است.

مواد غذایی	مقدار کلسیم	واحد
کشک	۱ لیوان	۲۶۰ میلی‌گرم
شیر گاو	۱ لیوان	۳۰۰ میلی‌گرم
شیر گوسفند	۱ لیوان	۴۵۷ میلی‌گرم
پنیر	یک قوطی کبریت	۲۱۶ میلی‌گرم
بستنی	۱ لیوان	۲۰۰ میلی‌گرم
ماست	۱ لیوان	۳۰۰ میلی‌گرم
ماهی ساردین	۴ قطعه نازک	۵۵۰ میلی‌گرم
لوبیا سویا	۱۰۰ گرم	۲۵۷ میلی‌گرم
لوبیا چیتی	۱۰۰ گرم	۱۵۰ میلی‌گرم
لوبیا پختی	۱۰۰ گرم	۱۷۷ میلی‌گرم
شاهی	۱۰۰ گرم	۸۵ میلی‌گرم
اسفناج پخته	۱۰۰ گرم	۱۲۸ میلی‌گرم
کلم پیچ	۱۰۰ گرم	۲۱۲ میلی‌گرم
بروکلی پخته	۱۰۰ گرم	۱۰۵ میلی‌گرم
جعفری	۱۰۰ گرم	۲۴۵ میلی‌گرم
کنجد	۱۰۰ گرم	۷۸۳ میلی‌گرم
تخمه آفتابگردان	۱۰۰ گرم	۳۶۰ میلی‌گرم
انجیر خشک	۱۰۰ گرم	۱۹۳ میلی‌گرم
آلبالو خشک	۱۰۰ گرم	۲۰۰ میلی‌گرم
بادام	۱۰۰ گرم	۲۵۲ میلی‌گرم
پسته	۱۰۰ گرم	۱۳۶ میلی‌گرم

پیشگیری از زمین خوردن

ایمن سازی خانه



انجام ورزش‌های منظم جهت تقویت عضلات و افزایش تعادل




توجه به سلامت شنوایی و بینایی



پوشیدن کفش‌های راحت و پاشنه کوتاه که لیز نباشند




داشتن رژیم غذایی سالم شامل میوه‌ها، سبزی‌ها و غذاهای با کلسیم بالا



حفظ توده بدنی مناسب

شاخص توده بدنی که به صورت وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر توان دوم قد بر حسب متر محاسبه می‌شود، در محدوده بین ۱۸/۵ و ۲۴/۹ طبیعی می‌باشد و خارج از این بازه به ترتیب کمبود وزن و اضافه وزن را نشان می‌دهد. حفظ این شاخص در محدوده ۱۹ تا ۲۴/۹ کیلوگرم بر متر مربع اثر محافظتی در برابر ابتلا به پوکی استخوان دارد.



دریافت کافی نور خورشید

قرار دادن پوست یک پا دو بار در روز و هر بار در حدود ۱۰ دقیقه، در معرض تابش نور خورشید در ساعات غیر از زمان اوج تابش (صبح ۲ تا بعد از ظهر). وجود شیشه مانع جذب نور خورشید است.



پرهیز از مصرف دخانیات و الکل



رژیم غذایی سالم و غنی از مواد ضروری برای سلامت استخوان

کلسیم لبنیات (شیر، ماست، پنیر، دوغ، کشک و ...)، گوشت، مرغ، ماهی، میگو، سفیده تخم‌مرغ، سبزیجات برگ سبز

ویتامین دی ماهی‌های پرچرب از قبیل ماهی تن و ساردین، تخم مرغ

پروتئین لبنیات، گوشت، ماهی، تخم مرغ و منابع گیاهی مانند حبوبات (لوبیا، عدس)، آجیل و سویا

منیزیم سبزیجات سبز، حبوبات، ماهی، میوه‌های خشک مثل زردالو، کشمش و آلو

روی گوشت قرمز و حبوبات

ورزش و فعالیت بدنی

- شنا رفتن روی دیوار (wall push up)
- بنشین پاشو (sit to stand)
- بالا رفتن از پله (set up/ stair climb)
- بالا آوردن پا از پهلو (outward leg raises)
- راهپیمایی درجا (standing march)
- بلند کردن پاشنه پا (standing heel raises/toe raises)
- ایستادن با یک پا (single leg stand)
- بردن پا به داخل (inward leg raises)
- بردن پا به عقب و بالا (back leg raise)

افراد در معرض ابتلا به پوکی استخوان

ابتلا به بیماری‌های زمینه‌ای

پرکاری غده تیروئید و پاراتیروئید



بیماری‌های غدد و متابولیسم مثل دیابت نوع یک و دو



بیماری‌هایی که باعث عدم تحرک می‌شوند




روماتیسم مفصلی



بیماری مزمن کلیوی



شرایط تغذیه‌ای/ گوارشی مانند بیماری التهابی روده و سلیاک (حساسیت به گلوتن)



بیماری‌های اعصاب و روان مثل افسردگی ماژور




بیماری انسدادی ریه و آسم



سرطان‌ها



عدم تحمل لاکتوز



مصرف داروهای خاص

مصرف داروها از قبیل کورتون، هورمون‌های استروئیدی مثل مدرکسی پروژسترون، پنتوپرازول، برخی داروهای افرادی دیابتی مثل پیوگلیتازون، داروهای ضد افسردگی SSRI مثل سرتالین، داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، هورمون‌های تیروئید در دوز بالا، برخی داروهای ضد روان‌پریشی مثل لیتیم، برخی داروهای ضد صرع مثل فنئوئین و کاربامازپین، و برخی داروهای ضد انعقاد مثل هپارین.

سابقه خانوادگی

سابقه خانوادگی پوکی استخوان یا شکستگی با ضربه خفیف به خصوص شکستگی لگن

سن

بالای ۷۰ سال در آقایان



بالای ۵۰ سال در خانم‌ها



جنس مونث

زنان بیشتر از مردان در معرض پوکی استخوان هستند.



یائسگی

یائسگی و خصوصاً یائسگی زودرس (زیر ۴۰ سال) خطر ابتلا به پوکی استخوان را افزایش می‌دهد.

